

# 1 Verjetnost

## 1.1 Normalna porazdelitev

Vemo, da je vrednost hemoglobina pri nedopingiranem športniku<sup>1</sup> porazdeljena normalno s povprečjem  $\mu = 148$  in varianco  $\sigma^2 = 85$ . Označimo vrednost hemoglobina z  $X$ , torej  $X \sim N(148,85)$ .

- Izračunajte verjetnost, da je posameznikova vrednost večja od 166. V ta namen izpeljite formulo:
  - Naj bo  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , kako je porazdeljena slučajna spremenljivka  $Y = aX + b$ , kjer je  $a > 0$ ?  
*Namig:* Zapišite najprej porazdelitveno funkcijo, nato izrazite gostoto. Ali lahko gostoto zapišete kot gostoto normalne spremenljivke?
  - Kaj moramo vzeti kot  $a$  in  $b$ , da bo  $Y$  standardizirana normalna spremenljivka?
- Izračunajte (simetrične) meje, ki jih nedopingiran športnik preseže z verjetnostjo manj kot 0,01.
- Naj bodo meje take, kot ste jih izračunali v prejšnji točki. Športnika testiramo 10x na leto. Kakšna je verjetnost, da vsaj enkrat preseže meje (pri tem predpostavimo, da so meritve narejene v dovolj velikih časovnih presledkih, da so med seboj neodvisne)?
- Naj bo  $Y \sim N(0,1)$ . Izračunajte porazdelitev slučajne spremenljivke  $Y^2$ . Katero znano porazdelitev dobite?  
*Namig:* Porazdelitev gama ima gostoto  $f_T(t) = \frac{\lambda^\alpha t^{\alpha-1} e^{-\lambda t}}{\Gamma(\alpha)}$ .

---

<sup>1</sup>Krvni doping je metoda, pri kateri si športnik kri najprej odvzame, nato pa si jo včrpa pred pomembnim nastopom in tako umetno poveča število rdečih krvničk ter si s tem izboljša trenutno počutje in vzdržljivost. Ker ni udeleženi tujih substanc, krvnega dopinga ni mogoče neposredno odkriti. Zato ga skušajo odkrivati s statističnimi metodami - doping naj bi nakazovale vrednosti krvnih parametrov (hemoglobina), ki pretirano narastejo (včrpanje) oz. padejo (odvzem).

- Raziskovalci na področju športa so dokazali, da je pri biatloncih hemoglobin izven tekmovalnega obdobja porazdeljen kot  $N(150, 80)$ , med tekmovalnim obdobjem pa kot  $N(146, 80)$ . Tekmovalno obdobje je pri teh športnikih dolgo približno pol leta. Zanima nas porazdelitev hemoglobina, če ne vemo, kdaj je bil vzorec odvzet. Ali je ta porazdelitev še vedno normalna?

*Namig:*  $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$ , če velja  $P(\bigcap_{i=1}^n B_i) = 0$  in  $P(\bigcup_{i=1}^n B_i) = 1$ .

### Domača naloga v R-u:

- Generirajte 10000 realizacij normalno porazdeljene spremenljivke  $X \sim N(148, 85)$  (`rnorm`). Narišite histogram (`hist`), izračunajte delež vrednosti nad 166 (`sum(x>166)/10000`).
- Oglejte si funkcijo `qnorm` in z njo poiščite meje, izven katerih je športnik z verjetnostjo 0,01. Primerjajte z deležem v vašem primeru.
- Transformirajte vrednosti spremenljivke  $X$  tako, da dobite standardizirano normalno spremenljivko ( $y=(x-148)/\text{sqrt}(85)$ ). Preverite grafično s histogramom.
- Generirajte po 10 vrednosti za 10000 posameznikov. Izračunajte delež posameznikov, ki imajo vsaj eno vrednost izven intervala  $[124,2, 171,8]$ .
- Narišite histogram za vrednosti  $X^2$ , primerjajte z rezultatoma funkcij `rgamma` in `rchisq`.
- Narišite se porazdelitev slučajne spremenljivke iz zadnje točke (uporabite bolj različni povprečji, da se prepričate, da porazdelitev zares ni normalna).

## 1.2 Generiranje slučajnih spremenljivk s pomočjo enakomerne porazdelitve

Generator (psevdo)slučajnih vrednosti iz enakomerne spremenljivke zgenerira željeno število vrednosti  $x_i$ , ki so porazdeljene kot  $X \sim U[0, 1]$ .

- Kako bi s pomočjo tega generatorja dobili 10 realizacij Bernoullijevo porazdeljene spremenljivke  $Y$ , pri kateri je  $P(Y = 1) = 0,1$ ?
- Recimo, da imamo spet 10 enot, vendar jim želimo dati različne verjetnosti, da bodo izžrebane. Prvih pet enot želimo izžrebati z verjetnostjo 0,3, drugih pet pa z verjetnostjo 0,1 (kot primer si zamislimo žreb, v katerem želimo dati prednost ženskam. Verjetnost za vsakega posameznika v našem vzorcu določimo glede na spol - prvih pet je žensk, drugih pet je moških). Kako bi iz istim generatorjem zagotovili ustrezno porazdelitev?
- Naj bo  $Z = F(X)$ , kjer je  $F$  porazdelitvena funkcija slučajne spremenljivke  $X$ .
  - Narišite ustrezen graf (na abscisi so vrednosti  $X$ , na ordinati pa  $Z$ )
  - Kakšne vrednosti lahko zavzame spremenljivka  $Z$ ?
  - Naj bo  $X \sim N(0, 1)$ . Pri kateri vrednosti  $X$  bo  $Z = 0,5$ ? Kakšna je torej verjetnost, da je  $Z \leq 0,5$ ?
  - Naj bo  $X \sim N(0, 1)$ . Pri kateri vrednosti  $X$  bo  $Z = 0,975$ ? Kakšna je torej verjetnost, da je  $Z \leq 0,975$ ?
  - Teoretično izpeljite  $F_Z(z)$  za poljuben  $F$  (predpostavite, da je  $F^{-1}$  definiran za vse vrednosti, ki jih lahko zavzame  $X$ ).
- Naj bo  $U \sim U[0, 1]$  in  $X = F^{-1}(U)$ . Pokažite, da je  $F$  porazdelitvena funkcija spremenljivke  $X$ .
- Želimo simulirati vrednosti iz eksponentne porazdelitve ( $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ , za  $x > 0$ ). Kako bi jih lahko simulirali z uporabo prej omenjenega generatorja?
- Kako bi hkrati simulirali vrednosti za posameznike z različno vrednostjo  $\lambda$ ?

### Domača naloga v R-u:

- Generirajte podatke za 10000 voznikov, tako da je 500 med njimi pijanih, 9500 pa treznih. Naj bo verjetnost, da ima pijan voznik avtomobilsko nesrečo 0,3, verjetnost za zdravega pa 0,003. Izračunajte delež nesreč na simuliranih podatkih in ga primerjajte z dejansko verjetnostjo nesreče.
- Generirajte podatke za 100 posameznikov, tako da bo njihova starost enakomerno porazdeljena med 50 in 80. Preverite s histogramom.
- Vzemimo, da je bila posameznikom iz prejšnje točke postavljena diagnoza hude bolezni. Generirajte čase preživetja z eksponentno porazdelitvijo, tako da bodo imeli starejši posamezniki večjo verjetnost, da umrejo prej.  
*Namig:* parameter  $\lambda$  naj bo premosorazmeren s starostjo, npr.  $\lambda = \text{starost}/100$ .