

# TEST ZA SAMOOCENJEVANJE

## SELF-ASSESSMENT TEST

(Pravilni odgovori bodo objavljeni v naslednji številki revije)

1. **Katera trditev o izpahu kolka je napačna?**
  - A. Najpogostejši je sprednji izpah kolka.
  - B. Pri izpahu kolka nazaj se lahko poškoduje ishiadični živec.
  - C. Pri sprednjem izpahu kolka se lahko poškoduje femoralni živec.
  - D. Najpogostejši vzrok izpaha kolka so prometne nesreče.
2. **V kašnem položaju bo spodnji ud pri izpahu kolka nazaj?**
  - A. iztegnjen, primaknjen in v notranji rotaciji;
  - B. upognjen, primaknjen, v notranji rotaciji;
  - C. iztegnjen, odmaknjen, v zunanji rotaciji;
  - D. upognjen, odmaknjen, v zunanji rotaciji.
3. **Katera ni sprednja kolenska burza?**
  - A. Prepatelarna burza;
  - B. burza pes anserinus;
  - C. globoka infrapatelarna burza;
  - D. suprapatelarna burza.
4. **Kaj je »nesrečna triada«?**
  - A. Poškodba notranjega in zunanjega meniskusa in sprednjega križne vezi;
  - B. sprednja križna vez, notranja kolateralna vez in notranji meniskus;
  - C. sprednja križna vez, zadnja križna vez in zunanji meniskus;
  - D. sprednja, zadnja križna vez ter notranja kolateralna vez.
5. **Kateri meniskus kolena je v obliki črke »O«?**
  - A. Sprednji meniskus;
  - B. zadnji meniskus;
  - C. zunanji meniskus;
  - D. notranji meniskus.
6. **Parasimpatični (kraniosakralni) del avtonomnega živčevja vključuje telesa presinaptičnih parasimpatičnih nevronov, ki se nahajajo na dveh mestih v osrednjem živčevju. Kateri od naštetih NI del kranialnega parasimpatičnega dela živčevja?**
  - A. Ciliarni ganglij;
  - B. celiakalni ganglij;
  - C. pterigopalatini ganglij;
  - D. otični ganglij.
7. **Okvara v središču optične kjazme bo povzročila:**
  - A. homonimno hemianopsijo;
  - B. bitemporalno hemianopsijo;
  - C. kortikalno slepoto;
  - D. slepoto na eno oko.
8. **Pri katerem od navedenih stanj bo rezultat elektromiografije in meritev prevajanja normalen, če nevrofiziološko diagnostiko izpeljemo ob pravem času?**
  - A. Bellova paraliza;
  - B. brahialna pleksopatija;
  - C. botiluzem;
  - D. miofascialna bolečina.
9. **Pri katerem od naštetih je napoved popravljanja živca najslabša?**
  - A. Pri aksonotmezi;
  - B. pri bloku prevajanja;
  - C. pri nevrapraksiji;
  - D. pri nevrotmezi.
10. **Pri ugotavljanju, ali je ulnarni živec okvarjen v komolcu ali zapestju, je pomembno:**
  - A. izmeriti prevajanje preko komolca;
  - B. izvesti igelno elektromiografijo 1. dorzalne medkostne mišice;
  - C. izmeriti prevajanje po dorzalnem ulnarnem kožnem živcu;
  - D. izmeriti prevajanja na 1. dorzalni medkostni mišici.
11. **Dedne nevropatije so običajno:**
  - A. segmentne demielinizirajoče;
  - B. uniformno demielinizirajoče;
  - C. aksonske;
  - D. mešane senzorične, motorične in demielinizirajoče.
12. **Predeli za hotene gibe, intelekt in govor se nahajajo v:**
  - A. parietalnem režnju;
  - B. frontalnem režnju;
  - C. temporalnem režnju;
  - D. okcipitalnem režnju.

- 13. Odgovor, ki ga izvabimo pri osebi z okvaro živčevja, ko čvrsto potegnemo po podplatu in se palec iztegne, imenujemo:**
- plantarni odgovor;
  - koreninski odgovor;
  - Morojev refleks;
  - podplatni odgovor.
- 14. Glavna veja arterijskega sistema, ki prehranjuje sprednji del možganov, prihaja iz:**
- vertebralne arterije;
  - bazilarne arterije;
  - notranje karotidne arterije;
  - zadnje karotidne arterije.
- 15. Disfagija je lahko posledica:**
- nevrološke okvare;
  - rakavega obolenja;
  - staranja;
  - vsega naštetega.
- 16. Pri katerem od naštetih obolenj tipično najdemo znake okvare zgornjih in spodnjih motoričnih nevronov?**
- Spinalna mišična atrofija tip 2;
  - primarna lateralna skleroza;
  - amiotrofična lateralna skleroza;
  - poliomielitis.
- 17. Kateri virus je vpleten v nastanek poliomielitisa?**
- Herpes virus;
  - papilovirus;
  - picornavirus;
  - poksvirus.
- 18. Pri kateri od miopatij je lahko okvarjena tudi kognicija?**
- Pri Beckerjevi mišični distrofiji;
  - pri Duchennovi mišični distrofiji;
  - pri facioskapulohumeralni distrofiji;
  - pri ramensko medeničnem sindromu.
- 19. Kateri od naštetih NI znak/simptom Parkinsonove bolezni?**
- Moten občutek za vibracijo ali položaj sklepa;
  - tremor v mirovanju;
  - upočasneni gibi;
  - tremor in mišična rigidnost.
- 20. Za uporabo kortikosteroidov pri multipli sklerozi velja:**
- Učinkoviti so pri dolgotrajni uporabi;
  - najbolj učinkoviti so pri simptomih malih možganov in senzoričnih motnjah;
  - uporabljamo jih za pospeševanje okrevanja;
  - uporabljamo jih za preprečevanje ponovnih zagonov.
- 21. Kaj od naštetega klasično najdemo pri Miller Fischer varianti Guillain-Barréjevega sindroma?**
- Oftalmoplegijo, ataksijo in arefleksijo;
  - disritmije, okvarjeno diaforezo, fotofobijo;
  - disfagijo, navzejo in diarejo;
  - vse naštet.
- 22. Kaj od naštetega je vodilni vzrok cerebralne paralize?**
- Nedonošenost;
  - pomanjkanje joda;
  - hiperbilirubinemija;
  - tetralogija Fallot.
- 23. Dejavniki, ki povečujejo tveganje za urinsko inkontinenco po možganski kapi, so vsi RAZEN:**
- moški spol;
  - višja starost;
  - hujša možganska kap;
  - sladkorna bolezen.
- 24. Dobra napoved okrevanja po možganski kapi je povezana:**
- s popolno paralizo zgornjega uda;
  - s podaljšano flacidnostjo;
  - s hudo proksimalno spastičnostjo;
  - z nekaj motoričnega okrevanja roke v štirih tednih.
- 25. Kateri od naštetih NI dejavnik tveganja za zmanjšano zmožnost po možganski kapi?**
- Obojestranska okvara;
  - hudo zanemarjanje prizadete strani;
  - nižja starost;
  - odlaganje rehabilitacije.
- 26. Epiduralni hematoma je najpogosteje posledica:**
- rupture srednje meningealne arterije;
  - rupture arteriovenske malformacije;
  - pretrganja mostnih ven med pio arahnoido in duro;
  - ničesar od naštetih.
- 27. 54-letna ženska je utrpela infarkt leve srednje možganske arterije. Pojavili so se okvarjeno razumevanje, tekoč govor, okvarjeno poimenovanje in homonimna hemianopsija. Najverjetnejša diagnoza je:**
- Brocova afazija;
  - prevodna afazija;
  - anomična afazija;
  - Wernickejeva afazija.
- 28. Kateri od naštetih NI sekundarni učinek zaprte poškodbe glave?**
- Hipoksija;
  - laceracija možganskih ovojnic/možganskega tkiva;
  - edem;
  - intrakranialna krvavitev (npr. subduralni hematoma).

**29. Kaj od naštetega NE velja za subduralni hematoma?**

- A. Primarno se pojavlja pri mlajših pacientih.
- B. Klinični znaki se lahko pojavijo čez nekaj tednov.
- C. Povzročča ga poškodba mostnih ven.
- D. Slikovne preiskave pokažejo lečasto obliko.

**30. Kaj velja za najučinkovitejšo metodo preprečevanja heterotopnih osifikacij?**

- A. Obsevanje kostnega tkiva;
- B. vaje za vzdrževanje obsega gibljivosti;
- C. nesteroidna protivnetna zdravila;
- D. bifosfonati.

Pravilni odgovori na vprašanja iz prejšnje številke / *Answers to self - assessment questions from previous issue:*

- |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| 1.  | A | 16. | A |
| 2.  | B | 17. | B |
| 3.  | C | 18. | A |
| 4.  | A | 19. | A |
| 5.  | D | 20. | D |
| 6.  | C | 21. | D |
| 7.  | A | 22. | C |
| 8.  | D | 23. | A |
| 9.  | A | 24. | D |
| 10. | D | 25. | C |
| 11. | A | 26. | B |
| 12. | A | 27. | B |
| 13. | B | 28. | B |
| 14. | D | 29. | C |
| 15. | B | 30. | D |