

# TEST ZA SAMOOCENJEVANJE

## SELF-ASSESSMENT TEST

(Pravilni odgovori bodo objavljeni v naslednji številki revije)

1. Afazijo tradicionalno pripisujemo okvari možganske skorje:
  - A. parietalnega režnja,
  - B. zatilnega režnja,
  - C. leve možganske poloble,
  - D. malih možganov.
2. Pri pacientu so v govoru prisotne parafazije in semantične zamenjave. Močno je prisotna tudi eholalija oziroma ponavljanje slišanih fraz. Pacientovo razumevanje je slabo, medtem ko pa je samo ponavljanje besed dobro. Slaba sta pisanje in branje. Pacient ima:
  - A. Wernickejevo afazijo,
  - B. transkortikalno senzorično afazijo,
  - C. Brocovo afazijo,
  - D. prevodno afazijo.
3. Neprogresivna motnja gibanja in drže zaradi okvare možganov, ki se pojavi v zgodnjem obdobju razvoja možganov, imenujemo:
  - A. distonija,
  - B. cerebralna paraliza,
  - C. ataksija,
  - D. diskinezija.
4. Zdravljenje disfagije NI namenjeno:
  - A. preprečevanju debelosti,
  - B. preprečevanju aspiracij,
  - C. izboljšanju prehranskega stanja,
  - D. izboljšanju hidracije.
5. Kaj lahko stori oseba z apraksijo požiranja, da si olajša hranjenje?
  - A. Jo hrani z manjšimi bolusi logoped ali skrbnik.
  - B. Omeji vnos soli.
  - C. Uporablja manever požiranja imenovan učinkovito požiranje.
  - D. Se hrani brez poslušanja številnih besednih navodil.
6. Med znake in simptome oralne disfagije NE vključujemo:
  - A. asimetrije ust in obraza,
  - B. težave pri zadrževanju hrane/tekočine v ustih,
  - C. zatekanja v nosno votlino,
  - D. antero-posteriornega prenosa v žrelo.
7. Katera trditev o multipli sklerozi je napačna?
  - A. Moške prizadene pogosteje kot ženske.
  - B. Belce prizadene pogosteje kot črnce.
  - C. Pojavljanje je pogostejše v višjih socioekonomskih razredih.
  - D. Ni sprememb dolgoročnih poslabšanj v nosečnosti.
8. Kateri od naštetih je slab napovedni dejavnik pri multipli sklerozi?
  - A. Starost ob pojavu bolezni višja od 35 let,
  - B. prvi pojav v obliki optičnega nevritisa,
  - C. monosinaptični simptomi,
  - D. ataksija in tremor.
9. Katera oblika pojavljanja multiple skleroze je najpogostejša?
  - A. Sekundarno napredujoča,
  - B. napredujoča z zagoni,
  - C. recidivno-remitentna,
  - D. primarno napredujoča.
10. Kateri od simptomov je redkejši pri pacientih z multiplo sklerozo?
  - A. Motnja delovanja črevesja/sečil,
  - B. manjši inteligenčni količnik,
  - C. bolečina,
  - D. utrudljivost.
11. Kaj od naštetega NI značilno za miastenični sindrom oziroma Lambert-Eatonov sindrom?
  - A. Paraneoplastični sindrom povezan z maloceličnim rakom pljuč.
  - B. Protitelesa proti presinaptičnim kalcijevim kanalčkom.
  - C. Proksimalna mišična šibkost, ki se izboljša po naporu.
  - D. Šibkost zunanjih očesnih mišic.
12. Katere od zdravil za zmanjšanje spastičnosti ima najmanjši učinek sedacije in kognitivne okvare?
  - A. Diazepam,
  - B. dantrolen natrij,
  - C. baklofen,
  - D. klonidin.
13. 12-letni deček pride na pregled zaradi napredujočega slabšanja sluha. Težave ima pri žvižganju pesmi, ki jo sliši po slušalkah na dobrem ušesu. Ob pregledu opazite hiperlordozo ledvene hrbtenice. Na katero bolezen posumite?
  - A. Duchennovo mišično distrofijo,
  - B. mišično distrofijo Emery-Dreifuss,
  - C. facioskapulohumeralno distrofijo
  - D. ramensko-medenični sindrom.

**14. Kaj od naštetega je lakunarni sindrom?**

- A. Čista motorična hemiplegija,
- B. čista senzorična možganska kap,
- C. sindrom nespretne roke,
- D. vse našteto.

**15. Katero od naštetih patognomoničnih okvar najpogosteje srečamo pri cerebralni paralizi?**

- A. Hidrocefalus,
- B. periventrikularno levkomalacijo,
- C. Arnold-Chiarijevo malformacijo,
- D. centralno pontino mielinolizo.

**16. Kaj od naštetega je postsinaptična motnja živčnomišičnega stika?**

- A. Miastenija gravis,
- B. botulizem,
- C. Lambert-Eatonov miastenični sindrom
- D. nič od naštetega.

**17. Dojenček s spinalno mišično atrofijo tipa I. (Werdnig-Hoffmanova bolezen) lahko:**

- A. šibko joka,
- B. ima težave pri hranjenju,
- C. slabo sesa,
- D. vse našteto.

**18. Kaj je vodilni vzrok smrti pri otrocih z živčnomišičnimi boleznimi?**

- A. Nevrološki zapleti,
- B. zapleti na ledvicah,
- C. pljučni zapleti,
- D. zapleti na srcu.

**19. Pri kateri od naštetih motenj je vzrok okvara fibrilina?**

- A. Osteogenesis imperfecta,
- B. revmatoidni artritis,
- C. Marfanov sindrom,
- D. skleroderma.

**20. Pri kateri od naštetih bolezni bo imel pacient negativni revmatoidni faktor (RF)?**

- A. Bolezen mešanega vezivnega tkiva,
- B. revmatoidni artritis,
- C. skleroderma,
- D. Sjogrenov sindrom.

**21. Pri kateri od bolezni najdemo krhke kosti in multiple zlome?**

- A. Juvenilni revmatoidni artritis,
- B. bolezen srpastih celic,
- C. osteogenesis imperfecta,
- D. osteoartroza.

**22. Kaj od naštetega je najbolj uničevalen element revmatoidnega artritisa?**

- A. Erozijske sklepe,
- B. nastajanje panusa,
- C. formiranje kristalov,
- D. revmatoidni vozlički.

**23. Kaj od naštetega NI značilnost Scheuermannove kifoze?**

- A. Klinasta telesa vretenc za vsaj 5 stopinj,
- B. zmanjševanje ukrivljenosti pri ekstenziji,
- C. prizadetost vsaj treh teles vretenc,
- D. klinasta deformacija z ožino v sprednjem delu.

**24. Kaj od naštetega najbolje opiše ekscentrično kontrakcijo mišice?**

- A. Povzroči večjo okvaro tkiva kot koncentrična kontrakcija.
- B. Metabolna poraba je velika.
- C. Pri kontrakciji se mišica krajša.
- D. Počasna ekscentrična kontrakcija generira večjo silo.

**25. Kaj od naštetega ni indikacija za zdravljenje z ogrevanjem?**

- A. Osteoartroza,
- B. kronično vnetje,
- C. kontraktura,
- D. nezadostna prekrvitev.

**26. Kaj od naštetega najbolje opiše mišična vlakna tipa 1.**

- A. Hitra, veliko oksidativnih encimov.
- B. Hitra, malo oksidativnih encimov.
- C. Vlakna z velikim premerom.
- D. Počasna, veliko oksidativnih encimov.

**27. Kaj je učinek ohlajanje (krioterapije)?**

- A. Nižja hitrost prevajanja.
- B. Večja aktivnost mišičnih vreten.
- C. Povišan metabolizem v tkivih.
- D. Znižan bolečinski prag.

**28. Pri kakšnem odstotku otrok s cerebralno paralizo se pojavljajo epileptični napadi?**

- A. 10%,
- B. 30%,
- C. 50%,
- D. 90%.

**29. Katera vrsta alergije je pogosta pri osebah z mielomeningokelo?**

- A. Alergija na milo,
- B. alergija na cvetni prah,
- C. alergija na lateks,
- D. alergija na hišni prah.

**30. V kateri ravni se najpogosteje pojavi mielomeningokela?**

- A. Zgornji prsni,
- B. vratni,
- C. spodnji prsni,
- D. ledveni.

Pravilni odgovori na vprašanja iz prejšnje številke / *Answers to self - assessment questions from previous issue:*

- |       |       |
|-------|-------|
| 1. C  | 16. A |
| 2. A  | 17. C |
| 3. A  | 18. D |
| 4. D  | 19. C |
| 5. B  | 20. A |
| 6. C  | 21. D |
| 7. D  | 22. B |
| 8. B  | 23. B |
| 9. B  | 24. A |
| 10. B | 25. A |
| 11. C | 26. D |
| 12. A | 27. B |
| 13. C | 28. B |
| 14. B | 29. D |
| 15. B | 30. C |